

# Cirugía Plástica

Lipoescultura - Cirugía Estética y Reconstructiva - Medicina Estética

## CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENTOPLASTIA DE AUMENTO - Dr. José Carlos Zapata Díaz

Este es un documento de consentimiento informado que ha sido preparado por el Dr. José Carlos Zapata Díaz, Médico Cirujano Plástico con Colegio Médico del Perú N° 22414 y Registro Nacional de Especialista N° 10529, para ayudar a informarle sobre la MENTOPLASTIA DE AUMENTO MEDIANTE LA COLOCACION DE IMPLANTE DE ELASTOMERO DE SILICONA. Sus riesgos y los tratamientos alternativos. Por favor, ponga sus iniciales en cada página, indicando así que ha leído la página, y firme el consentimiento para el procedimiento propuesto por su cirujano.

### INTRODUCCIÓN

La mentoplastia de aumento, es una operación realizada con frecuencia por los cirujanos plásticos. Este procedimiento quirúrgico produce cambios en el aspecto del mentón o barbilla. La mentoplastia de aumento tiene como propósito "aumentar la proyección del mentón", adelantándolo, se puede variar su altura, o puede modificar su forma. Esta operación puede ayudar a corregir defectos congénitos y alteraciones adquiridas.

No existe un tipo universal de mentoplastia que cubra las necesidades de cada paciente. La cirugía de mentoplastia se diseña para cada paciente, dependiendo de sus necesidades y las proporciones de su estructura facial. Las incisiones pueden hacerse por dentro de la boca encima del surco de la encía inferior, o por fuera de la boca (en muy pocos casos), a través de la piel de debajo del mentón quedando disimuladas en lugares poco visibles como el pliegue submentoniano.

El mejor candidato para este tipo de cirugía es el individuo que busca la mejoría, no la perfección, en el aspecto de su mentón. Además, tener expectativas realistas, buena salud y estabilidad psicológica son características importantes en un paciente que considere una mentoplastia. La mentoplastia puede realizarse en conjunto con otras cirugías.

### TRATAMIENTO ALTERNATIVO

Las formas alternativas de manejo consisten en no realizar cirugía de mentoplastia. Ciertas alteraciones de la posición de los arcos dentarios pueden requerir tratamientos ortognáticos u osteotomías de avance o retroceso mandibular o maxilar, para asegurar un buen funcionalismo de la masticación, **este porcedimiento lo realiza el cirujano buco-maxilo-facial**. Existen riesgos y complicaciones potenciales asociados con las formas alternativas de tratamiento que requieren cirugía, como las osteotomías de avance o retroceso mandibular o maxilar.

### RIESGOS DE LA MENTOPLASTIA DE AUMENTO

Como cualquier tipo de procedimiento quirurgico entraña un riesgo inherente. La decisión individual de someterse a cualquier tipo de cirugía se basa en la comparación del riesgo con el beneficio potencial. Aunque la mayoría de los pacientes no experimentan las siguientes complicaciones, usted debería discutir cada una de ellas con el Dr. Zapata, para asegurarse de que comprende los riesgos, complicaciones potenciales y consecuencias de la mentoplastia.

**Sangrado.** Es posible, aunque muy raro, que se presente un episodio de hemorragia durante o después de la cirugía. Si se desarrolla una hemorragia postoperatoria, puede requerir tratamiento de drenaje del hematoma y puede ser necesario o no el retiro del implante. No debe tomar aspirina o antiinflamatorios desde 10 días antes de la cirugía, puesto que pueden aumentar el riesgo de problemas de sangrado. La hipertensión (aumento de la presión sanguínea) que no está bien controlada médicamente puede ser causa de sangrado durante o después de la cirugía. Pero lo mas importante es que guarde reposo y sig alas indicaciones del Dr. Zapata

Paciente: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ (1 de 3)

# Cirugía Plástica

Lipoescultura - Cirugía Estética y Reconstructiva - Medicina Estética

**Infección.** La infección después de la cirugía es muy rara. Si ocurre una infección, puede ser necesario tratamiento adicional, incluyendo antibióticos o la retirada del implante de mentón.

**Cicatrización.** Aunque se espera una buena curación de la herida después del procedimiento quirúrgico, pueden darse cicatrices anormales tanto en la piel (este abordaje por el pliegue submentoniano se realiza en menos del 5% de pacientes), como en los tejidos profundos. Las cicatrices pueden ser inestéticas o de diferente color al de la piel circundante. Existe la posibilidad de marcas visibles por las suturas. La cicatriz de la mucosa oral, es casi imperceptible al cabo de pocos meses.

**Lesión de estructuras profundas.** Lesión de estructuras profundas tales como nervios, vasos sanguíneos y músculos es casi improbable por que el plano de colocación del implante es a nivel sub-periosteal. La lesión de estructuras profundas puede ser temporal generalmente.

**Extrusión del implante.** La falta de adecuada cobertura tisular, una infección o traumatismos en la zona del mentón pueden dar como resultado la exposición y extrusión del implante.

**Resultado insatisfactorio.** Existe la posibilidad de un resultado insatisfactorio de la mentoplastia. Usted puede estar insatisfecho porque los resultados de la mentoplastia no coincidan con sus expectativas. Puede necesitarse cirugía adicional si el resultado de la mentoplastia es insatisfactorio.

**Pérdida de sensibilidad.** Existe la posibilidad de adormecimiento temporal, en muy pocos casos permanente de la piel del labio inferior después de la mentoplastia. La ocurrencia de este hecho no es predecible. La disminución o pérdida de la sensibilidad de la piel en el área del mentón se recupera en un tiempo variable.

**Asimetría.** La cara humana es normalmente asimétrica. Puede haber variación entre un lado y otro en el resultado de una mentoplastia.

**Reacciones alérgicas.** En casos raros se han descrito alergias locales al esparadrapo, material de sutura o preparados tópicos. Pueden ocurrir reacciones sistémicas, que son más graves, frente a medicaciones usadas durante la cirugía o prescritas después. Las reacciones alérgicas pueden requerir tratamiento adicional.

**Retraso en la cicatrización.** Existe la posibilidad de una apertura de la herida o de una cicatrización retrasada. Algunas zonas de la cara pueden no curar normalmente y tardar un tiempo largo en cicatrizar.

**Efectos a largo plazo.** Pueden ocurrir alteraciones subsecuentes en el aspecto del mentón como consecuencia del envejecimiento, exposición al sol, u otras circunstancias no relacionadas con la mentoplastia. Puede necesitarse en un futuro cirugía u otros tratamientos para mantener los resultados de una mentoplastia.

**Depresión ósea.** Existe la posibilidad de que la cirugía de aumento del mentón mediante colocación de implantes favorezca el desarrollo de una depresión o huella en la superficie ósea de apoyo del implante. La ocurrencia de este hecho es rara. Sin embargo, si ocurre puede necesitarse tratamiento quirúrgico adicional para retirar o cambiar el implante.

**Anestesia.** Tanto la anestesia local como la general implican un cierto riesgo. Esta cirugía se realiza con anestesia local mas sedación endovenosa, la posibilidad de complicaciones es muy raro.

Paciente: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ (2 de 3)

# Cirugía Plástica

---

Lipoescultura - Cirugía Estética y Reconstructiva - Medicina Estética

Sin embargo, no debe considerarse que los documentos de consentimiento informado incluyan todos los aspectos sobre otros métodos de tratamiento o riesgos posibles. Su cirujano plástico puede proporcionarle información adicional o diferente, basada en todos los hechos de su caso particular y en el estado del conocimiento médico. Los documentos de consentimiento informado no pretenden definir o servir como el modelo del cuidado médico. Este será determinado en base a todos los hechos involucrados en un caso individual y está sujeto a cambios, puesto que el conocimiento científico y la tecnología avanzan y los modelos de práctica evolucionan.

**ES IMPORTANTE QUE LEA CUIDADOSAMENTE LA INFORMACIÓN ANTERIOR Y HAYAN SIDO RESPONDIDAS TODAS SUS PREGUNTAS ANTES DE QUE FIRME EL CONSENTIMIENTO DE LA PÁGINA SIGUIENTE.**

Paciente: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ (3 de 3)



# Cirugía Plástica

Lipoescultura - Cirugía Estética y Reconstructiva - Medicina Estética

## CONSENTIMIENTO PARA CIRUGÍA / PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO

1. Por la presente autorizo al Dr. José Carlos Zapata Díaz y a su equipo de ayudantes que sean seleccionados para realizar el siguiente procedimiento o tratamiento: MENTOPLASTIA DE AUMENTO ESTETICA.
2. He leído, comprendido y firmado las páginas del folleto informativo adjunto: "CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENTOPLASTIA DE AUMENTO"
3. Doy fe de no haber omitido o alterado datos al exponer mi historial y antecedentes clínico-quirúrgicos, especialmente los referidos a alergias y enfermedades o riesgos personales.
4. Doy el consentimiento para la administración anestésicos y/o sedación o hipno-analgésia que se consideren necesarios o aconsejables.
5. Estoy de acuerdo en que no se me ha dado garantía por parte de nadie en cuanto al resultado que puede ser obtenido, todo acto médico-quirúrgico es un acto médico, no una ciencia exacta.
6. Doy el consentimiento para el fotografiado o la filmación del procedimiento de ser necesario, con fines médicos, científicos o educativos, puesto que mi identidad no será revelada en las imágenes.  
SE ME HA PREGUNTADO SI QUIERO UNA INFORMACIÓN MAS DETALLADA, PERO ESTOY SATISFECHA(O) CON LA EXPLICACIÓN Y NO NECESITO MAS INFORMACIÓN.  
a.- EL TRATAMIENTO CITADO ANTERIORMENTE O PROCEDIMIENTO A REALIZAR.  
b.- LOS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS O MÉTODOS DE TRATAMIENTO.  
c.- LOS RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO PROPUESTO.  
d.- LOCALIZACIÓN DE LAS CICATRICES: En el interior de la boca.

Fecha: Lima,.....de.....del 202...

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Nombre:.....  
Paciente

Nombre:.....  
Testigo

Dr. José Carlos Zapata Díaz  
Cirujano Plástico